

新編醫學正傳

醫學正傳卷之七目錄

○婦人科

經脈論

脉法

丹溪方法

凡三十三條

固經丸

崩漏有虛有熱

加味四物止血方

崩漏曰氣所使方

婦人病宜用當歸說

帶下是溫熱為病

肥人帶下溫痰方

結痰帶下小胃丹

治白帶方

又治白帶方

治帶黃荊子方

羅先生治帶方

帶下必須斷厚味

一人頭風帶下方

四物湯為婦人衆疾總司說

東垣治帶主寒

赤白葵花治帶說

調經升陽除濕湯

涼血地黃湯

酒煮當歸丸

固真丸

烏藥湯

助陽湯

丁香膠艾湯

火府丹

黃芪當歸人參湯

當歸芍藥湯

柴胡調經湯

益胃升陽湯

升陽舉經湯

當歸附子湯

調經補真湯

柴胡丁香湯

延胡苦練湯

桂附湯

人參補氣湯

黃芪白朮湯

增味四物湯

補經固真湯

溫胃補血湯

立効散

四聖散

溫經除濕湯

桃仁散

通經下取方

通經丸

膠艾湯

加減四物湯

元戎加味四物湯

香附一物丸

艾附丸

地黃通經丸

益母丸

苦練丸

丹溪活套

祖傳通經秘方

又月經不通方

祖傳血崩方

又補傳血崩方

已試鑒驗一條

○婦人科

胎前論

附期嗣法

脉法

丹溪方法

九四條

固胎飲

安胎飲

安胎丸

又丹溪方法九三條

懷妊嗜物說

胎動說

胎漏方

又胎漏方

又胎漏方

胎痛方

心腹諸痛方

又妊娘心腹疴痛方

心腹諸痛

九四方

川芎散

妊娘腰痛如折方

妊娘腰脚腫痛方

胎腫方

惡阻方

半夏茯苓湯

孕婦嘔吐鑒按

參橘散

小膠艾湯

又膠艾湯

妊娘下血不止方

妊娘下血如月信來方

胎孕無故下血方

胎動衝心煩悶方

妊娠因舉重仆跌方

妊娠遺尿失禁方

子煩方

治子煩犀角散

治子煩當歸飲

治子煩竹瀝湯

產室澤瀉散

張仲景方法

木通散

金生白朮散

鯉魚湯

紫蘇飲

天仙藤散

安棗散

地膚子湯

治子淋方

冬葵子散

車前散

忘憂散

萸根湯

防己湯

消風散

天門冬飲

百合散

緩息丹

八味丸

丹溪參朮飲

丹溪轉胞論

安胎散

如聖散

加味四物湯

苧根湯

桑寄生散

羚羊角散

歸涼節命散

白扁豆散

芎藭補中湯

當歸芎藥湯

芎木香連丸

妊娠泄瀉方

芎蘇散

升麻六物湯

妊娠傷寒體痛方

傷寒安胎方

又妊娠傷寒方

催生散

妊娠咳嗽方

妊娠嗽紅腫方

小產下血不止方

小產後心腹痛方

安榮湯

兒在腹中叫哭方

又治鳴胎方

丹溪東胎丸

丹溪達生散

臨月養胎方

催生散

紅莧馬齒墮胎說

難產多是氣血虛說

難產多見於安逸說

金匱當歸散

金液丸

催生鉛丹

如神丹

如聖散

香桂散

來甦散

霹靂奪命丹

無憂散

催生奪命如神丹

芎歸湯

奪命丹

黑龍丹

胞衣不下方

枳殼散

藥石禁

飲食禁忌篇

臨產須知九十九條

難產說

灸難產法

橫倒產方

又治橫生方

又橫逆不順方

礙產說

兒身向未順說

治盤腸產法

子死腹中方

下死胎牛膝丸

子死腹中不出方

又治子死腹中方

生子下血過多方

胞衣不下方

丹溪活套

祖傳經驗秘方

又祖傳催生驗方

祖傳治胞衣不下三退飲

○婦人科

產後論

脉法

丹溪方法九十一

嚴氏清血散

愈風湯

新產不可用芍藥

產後乳汁不通方

產後泄瀉痢方

乳母小水短少說

產婦損破尿脬

黑神散

人參當歸散

當歸黃芪湯

失笑散

三聖散

抵聖散

當歸羊肉湯

茯苓散

當歸散

黃芪湯

增損四物湯

四物一黃散

產室黑龍丹

烏金散

調經散

正脾散

栢子仁散

琥珀散

交感地黃煎丸

七珍散

調中湯

定痛散

麻仁丸

羊肉湯

滋腸五仁丸

固經丸

熟乾地黃丸

拒勝湯

八味理中丸



旋覆花湯

四神散

當歸養血丸

宿腎子飲

當歸黃芪飲

當歸散

桃仁膏

疏黃湯

乳汁不通方

漏芦湯

鍾乳散

母猪蹄湯

丹溪活套

新編醫學正傳卷之七

花溪恒德老人盧稱天民編集

姪孫虞年惠惟明校正

婦人科上月經

論內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息奔者死不治難經曰心出血肝納血肺出氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而熾若夫經閉不通之証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰母令能子虞是以脾不磨而食亦少所謂二陽之病發心脾者此也二陽者陽明也因食少故肺金亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰况月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或先或後淋瀝無時

若不早治漸而至於閉塞不通甚則爲癥瘕血膈勞極之証  
不易治也又如崩漏不止之証先因心火亢甚於是血脉泛  
溢以致肝實而不納血出納之道遂廢經曰子能令母實是  
以肝腎之相火挾心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄  
行無時而泛溢也若不早治漸而至於崩中不息甚則化爲  
白濁白淫血枯發熱勞極之証不可治矣經曰邪氣盛則實  
正氣奪則虛所謂心血不足者正氣奪也心火亢甚者邪氣  
盛也邪氣者相火也丹溪曰天非此火不能生物人非此火不能有  
生但貴乎適中凡動必聽命乎心君則無已上諸証大抵經  
閉不行與夫經漏不止其初皆由心事不足以致月經不調  
早不調治直至危篤求鑿雖妙手莫能爲矣東垣經閉不行  
有三論崩漏不止亦有三論學者宜參究其論以治之不可

拘攣

脈法

○脉經曰寸口脉微而瀋微則衛氣不足牆則榮氣無餘衛不足其息短其形燥血不足其形逆榮衛俱虛言語謬語跌陽脉微而瀋又則胃氣虛則短氣咽燥而口苦胃氣瀋則失液少陰脉微而遲微則無精遲則陰中塞瀋則血不來此爲  
居經三月一來  
寒

○脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可不者此爲  
居經三月一來

○脉微弱而遊年少得此爲無子中年得此爲絕產

○寸口脉沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚澹胃氣衰則身體腫少陽脉卑少陰

脉細男子則小便不利婦人則經水不通經爲血不利則爲水名曰水分

○寸口脉沉而數數則爲出沉則爲入出則爲陽實入則爲陰結跌陽脉微而弦微則無胃氣弦則不得息以陰脉沉而滑沉則爲在裏滑則爲實沉滑相搏血結胞門其藏不瀉經絡不通名曰血分○經水前斷後病水名曰血分此病雖治先病水後經斷名曰水分此病易治

○婦人帶下六極之病脉浮則爲勝鳴腹滿緊則爲腹中痛數則爲陰中痒痛則生瘡弦則陰戶掣痛

○婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

○婦人寸口脉浮而弱浮則爲虛弱則爲血浮則短氣弱則有熱而自汗出

○跌陽脉浮而濡則氣滯滯則有寒喜噫吞酸其氣時下小腹則寒

○少陰脉滑而數者陰中生瘡

○少陰脉數則氣淋陰中生瘡

○少陰脉弦者白腸必挺核

○少陰脉浮而動浮則爲虛動則爲痛婦人則脫下

○婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生

○婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大緊實數者死

○婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱小者死

○少陰脉浮而緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡

寒絕產

○肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者胃上有寒

○婦人月經一月再來者經來其脉欲自如常而反微不利不汗出者其經二月必來

方法

丹溪方云  
九十二條

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久糞盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨証用之或因七情傷心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

○虛中有熱月事不來以

四物湯加黃芩治之

○常過期者血少也以

諸婦血虛寒者治之

○過期紫黑有塊作痛血熱也以

四物湯加香附黃連

○過期色淡挾痰者以

二陳湯加芎歸

○常不及期者血熱也以

四物湯加黃芩黃連香附肥人多熱痰藥治之

○血枯經閉者以

紅四物湯加經花桃仁

○痰多佔住血海地位因而下多者目必漸昏肥人多有之以

南星蒼朮川芎香附作丸服之

○肥人軀脂滿經閉者以

痰嗽一本作隔



導痰湯如芎歸黃連不可服地黃泥疾故也如用必以姜汁炒肥人少子亦由痰多脂膜閉塞子宮不能受精而施化也宜服上藥

○瘦人子宮無血精氣不聚亦令無子以

四物湯養血養陰等藥

○經水未行臨經將來作疼者血實也一曰瘀血鬱滯也以四物湯加桃仁香附黃連紅花或加玄胡索莪朮木香有熱架柴胡黃芩

○經水行後而作疼者氣血俱虛也以八物湯加減煎服

○夫血爲氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者氣血虛也色淡者亦虛也而有水以混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱黑則熱之甚也今

人悉指為風冷而行溫熱之劑補不旋踵

○調經散治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月兩來皆可服

川歸

酒洗一錢半

麥門冬

去心二錢

吳茱萸

擇去閉目者湯泡七

人參

去芦一錢

半夏

湯泡七錢

白芍藥

一錢

川芎

一錢

牡丹皮

去心一錢

肉桂

半錢

阿膠珠

甘草

各七分半

右細切作一服水二盞加生三片煎至一盞空心稍熱服

○月經過期不行宜服

當歸

一錢半

川芎

半錢

熟地黃

一錢

白芍藥

一錢

桃仁

二十箇去皮尖研

紅花

三分

香附米

一錢

熟桂

半錢

蓬莪朮

一錢

甘草

伍分

蘇木

一錢

木通

八分

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心溫服

○月經先期而來宜服

歸身半錢

川芎半錢

白芍藥八分

生地黄一錢

阿膠半錢

艾葉半錢

條芩一錢

甘草半錢

香附一錢

黃柏半錢

知母半錢

黃連姜汁拌炒

右細切作一服水煎空心服

○經不通用馬鞭草杵汁熬膏為丸或燒存性為丸紅花當歸

煎湯送下

○固經丸治經水過多不止

黃芩

龜板

白芍藥各一兩

樗根白皮七錢

黃柏炒三錢

香附童便浸一宿

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九白湯下

○崩漏有虛有熱虛則下漏熱則流通急則治其標用白芷煎湯調下百草霜服或棕櫚灰或狗頭骨燒存性或伍靈脂半生半炒俱以酒調服後以四物湯加乾姜調補之緩則治其本四物湯加芩蓮參芪香附乾姜之類

○四物湯加荊芥穗條芩止血神効

○崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒黑歸身一錢白芍藥一錢酒炒熱地黃一錢川芎黃芪蒲黃地榆人參各半錢白朮一錢升麻三分煎服甚者加棕櫚灰爲末酒調服

○婦人血病宜用當歸若肥白人與人參黃芪同用瘦黑人宜與生地黃香附同用

○帶下是濕熱爲病白屬氣赤屬血以二陳湯加蒼朮治濕爲主氣虛入參朮血虛入芎歸

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知此以二陳湯加蒼白朮升麻柴胡甚者上用吐法以提其氣下用二陳加二朮仍用瓦礫子以燥其濕痰

○肥人帶下多是濕痰用海石半夏南星黃柏蒼朮川芎香附檉皮冬加乾姜瘦人少有此病有者是熱以滑石檉皮川芎海石青代丸服

○結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下後以補藥調治  
○一方治白帶

檉白皮

山茱萸

苦參

香附

各五錢

龜板

枳子

黃柏

乾姜

貝母

白芍藥

各二錢半

台烏細末酒糊為丸服

已上  
醫書  
卷之

白朮

四兩以石炭半斤燒三宿去灰以白朮炒焦為末清米飲調服之

下

○又方以黃荊子一味炒焦為末米飲調服上可治心經不可治白帶以其能燥濕痰也

○羅先生治帶用十棗湯神祐丸玉燭散此法實者可用靈者不可峻攻

○帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加姜附臨機應變用之

○一人上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮酒芩辛夷川芎

黃柏

炒焦

滑石半夏牡蛎粉丸服

○四物湯乃婦人衆疾之總司也

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

右細切等分水煎服

○東垣治崩漏帶下多主於寒學者宜再思之不可一途而論  
經曰陰盛陽搏謂之崩觀此可知

○東垣曰葵花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

○東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩  
不止多下水漿之物皆曰飲食不節勞倦所傷或素有心  
氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜卧困倦乏力氣短氣急  
脾主滋榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不  
調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣  
上伸以勝其濕又云火鬱則蒸之

當歸

酒洗

獨活

各半錢

蔓荊子

七分

防風

炙甘草

升麻

藥本

各一錢

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪

各一錢半

三 右細切作一服水五盞煎至一盞去粗空心溫服少時以  
早飯壓之可一服而已○如炙之太陰脾經中血海穴三  
七壯亦已○此藥乃從椎之法因風勝濕為胃氣下陷而  
氣迫於下以救其血之暴崩也住後必須服黃芪人參炙  
甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥  
便是也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止  
○涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火  
故血走而崩也

黃芩

荊芥穗

蔓荊子

各一分半

黃柏

知母

蘼本

細辛

川芎

各二分

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風

各三分

生地黃

當歸

各半

甘草

一錢



紅花火酒

右細切作一服水三大盞煎至一盞去粗空心稍熱服

○酒煮當歸治癰疽白帶下疰脚氣腰以下如在水雪中居  
火炕以厚衣重蓋猶寒肌肉消瘦小便與白帶長流而不  
禁固面白目青目眵無所見身重如山行步欹側腿膝  
枯細大便閉澁心下痞悶懊懣食不下面垢背寒此上中  
下三陽俱虛脉沉緊而澁按之空虛洪而無力尤為中寒  
之証乃氣血俱虛之極也

茴香

五錢

黑附子

炮

良姜

各七錢

當歸

一兩

右四味細切以好酒一升半煮至酒盡焙乾

炙甘草

苦楝

生用

丁香

各半錢

木香

升麻

柴胡

二錢

炒黃鹽

全蝎

各三錢

玄胡索 四錢

右與前四味同研爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五七十九空心跳醋湯送下忌油膩冷物及酒濕麪等○固真丸治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦忽目中溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒濕乘於胞內肝經陰火上益故目中溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也法當大瀉寒濕以此丸治之

黃柏 酒洗 白芍藥 各半錢

柴胡 白石脂 各一錢

白龍骨 酒煮水飛

當歸 酒洗 乾姜 四錢

右除龍骨石脂水飛日乾另研外餘共爲細末麪糊爲丸如鷄頭仁大日乾空心白湯下少時以早飯壓之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物酒濕麪

烏藥湯治婦人血海疼痛

當歸一錢

甘草

木香各五

烏藥一錢半

香附子二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

助陽湯治白帶下陰戶中痛空心面急痛身黃皮緩身重如

山陰寒如水

生黃芩

橘紅各五

防風

高良姜

乾姜

郁李仁

甘草

冬一錢三分 柴胡一錢三分

白葵花三分

右細切分作二服每服水盞煎二至一盞去粗食前稍熱服

丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞後及飲食不節所

得其脉两尺俱弦緊洪按之無力自覺臍下如冰冷白帶及白滑之物多間有如屋漏水下時或有群血右尺脉時或浮洪

熟地黄

白芍藥

各三

川芎

丁香

各四分

阿膠珠

六分

生艾葉

一錢

當歸

一錢二分

右以川芎地黄丁香另為細末其當歸芍藥艾葉各細切連前共六味入水五大盞煎至一盞半去粗入阿膠再上火煎至一大盞稍熱空心服

○水府丹治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痞塊腹中暴痛面有黥黯黎黑羸瘦

硃砂

經隔湯淋熱取

紅豆

五錢

桂心

另為末

木香

乾姜

各一

砂仁

二兩

花蕊石

煨研一兩半

班徇

一百箇去頭足

生地黄汁

童子尿

各一升

臘月狗膽

七枚

元蜻

三百箇去頭足糯米一鉢同炒黃色去米

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如鷄頭實大硃砂爲衣每服一丸食前細嚼溫酒送下米飲亦可

東

○黃芪當歸人參湯治婦人經水暴崩不止先因損身失血自

後一次縮一十日而來其後暴崩不止蓋因其人心窄性急多驚而心氣不足及飲食不節得之診得掌中寒脉沉細而緩帶數九竅不利四肢無力上喘氣促口鼻氣不調脾胃虛弱胃脘當心而痛左脇縮急當臍有動氣腹鳴下氣大便難宜先治其本餘証可去安心定志和脾胃益元氣補血養神以大熱劑去其寒少加生地黃去命門相火不令四肢痿弱

近東

黃蓮

二分

生地黄

三分

炒神麴

橘紅

桂枝

各五分

草薢

六分

黃芪

八分

麻黃

各一錢  
不去節

當歸身

一錢

杏仁

五枚另  
研如泥

右細切作一服水二盞半先煎麻黃令沸掠去沫煎至二盞下諸藥同煎至一盞食前服立止又以草豆蔻九十五丸以止胃脘客寒之痛并與肝積之藥除其病根

○當歸芍藥湯治婦人經水漏下不止其色鮮紅時值炎月先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂不思飲食四肢困倦大便時泄後復因心氣不足經水暴下不止微覺氣下行氣逆氣短懶於語言此藥主之

柴胡

二分

炙甘草

一錢

生地黄

各三分

黃芪

一錢

陳皮

連白

熟地黄

各五分

米泔浸

白朮

川芎

白芍藥錢各一

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服

東垣

○柴胡調經湯治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛脊骨強痛不安

炙甘草

當歸身

葛根各三分

獨活

藁本

升麻各半

柴胡七分

羌活

蒼木

錢各一

紅花火計

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服取微汗立止

東垣

○益胃升陽湯治婦人經候疑結黑血成塊左癰有血瘕水泄不止食有時不化後血塊暴下并水泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日三四行食罷煩心飲食減少人形瘦弱血脫益氣古聖人之法也先補

胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務益  
甘能生血陽生陰長之理也人身以穀氣為寶故先理胃  
氣為要

柴胡

升麻

各五分

炙甘草

當歸身

酒洗

陳皮

各一錢

人參

有嗽不用

炒神麴

各二錢

黃芪

一錢半

白朮

二錢

生黃芩

二分

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服○如腹中  
痛加白芍藥三分中桂少許○如渴或口乾加葛根三分  
不拘時服

○升陽舉經湯治經水不止右尺脉按之空虛是氣血俱脫大

寒之証輕手其脉數疾舉指弦緊或澁皆陽脫之証陰火  
亦亡見熱証口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫

刺垣



之舉之升之浮之燥之此法乃大升浮血氣補命門之下

脫

肉桂

夏月不用

白芍藥

各二分

紅花

半分

細辛

三分

人參

熟地黃

川芎

各半分

獨活根

黑附子

炮

炙甘草

各七分半

羌活

藥本

防風

各一錢

白朮

當歸

黃芪

柴胡

各一錢二分

桃仁泥

火許

右細切分作二服每服用水二大盞煎至一盞空心熱服

○當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

當歸

四分

炒鹽

三分

燉稍

升麻

各五分

甘草

炙六分

柴胡

七分

黃柏

火許為引

附子

炮一錢

乾姜

炮

良姜

各八分

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服或為細末酒麪糊為丸亦可

○調經補真湯冬後一月微有地泥水泮其白帶下陰戶中寒一服立止

獨活

乾姜

炮

藁本

防風

蒼朮

各二分

麻黃

不去節

炙甘草

人參

去芦

當歸身

白朮

生黃芩

升麻

各五分

黃芪

七分

良姜

澤瀉

羌活

各一錢

柴胡

四分

杏仁

二枚研

桂枝

少許

白葵花

七朵去萼

右細切作一服除黃芩麻黃另外先以水三大盞煎麻黃一味今沸掠去沫入餘藥同煎至二盞再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

垣東

○柴胡丁香湯治婦人年三十歲左右臨經先腰臍痛甚則腹

中亦痛經縮三二日

生地黃

五分

丁香

四分

當歸身

防風

羌活

各一錢

柴胡

二分

全蝎

一枚

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服之

垣東

○延胡苦練湯治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃柏

一分

延胡索

苦練子

各二分

附子

炮

肉桂

各三分

炙甘草

五分

熟地黃

一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

垣東

○桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒証

黃藥

為引用

知母

各五分

肉桂

五分

附子

炮三錢

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服○如少食常

垣東

飽腹中滿悶加白芍藥半錢○如不思飲食加五味子二十箇○如煩惱面上如虫行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢半人參七分炙甘草升麻各半錢

丁香末

二分

生甘草

炙甘草

各三分

生地黃

白芍藥

各半錢

熟地黃

六分

人參

去芦

防風

去芦

羌活

黃柏

知母

當歸身

升麻

各七分

柴胡

一錢

黃芪

一錢半

全蝎

一箇

五味子

二十箇

右細切作一服水二大盞煎至一盞空心稍熱服

○黃芪白朮湯治婦人四肢沉重自汗上至頭頸惡風頭痛躁

熱

垣東

細辛 二分

吳茱萸

川芎 各三分

柴胡

升麻 各四分

當歸身 六分 黃柏 酒洗

炙甘草

羌活 各八分

五味子 一錢 白朮

人參 各一錢半

黃芪 二錢半

右細切作一服水二大盞生姜五片煎至一盞去粗食前

稍熱服

東垣 ○增味四物湯治婦人血積血瘀

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

京三稜

乾漆 炒烟尽另研 肉桂 去塵

廣茂 各等分

右細切每服五錢水二大盞煎至一盞去粗空心溫服

東垣 ○補經固真湯治婦人白帶下流不止其心胞尺脉微細蓋始

病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止所謂

崩中日久爲白帶也乃本經血海枯竭津液復亡不能滋養筋骨以本部行經藥爲引用以大辛甘油膩之藥潤其枯而滋津液以大辛熱之藥補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥爲佐而益元氣

白葵花

研爛四分

陳皮

五分不白

生黃芩

細研另入

郁李仁

去皮尖研如泥

甘草炙

柴胡

錢各一

乾姜

細末

人參

二錢

右細切除黃芩外以水三盞煎至一盞半入黃芩同煎至一盞去粗空心熱服少時以早飯壓之

○溫胃補血湯治婦人耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味胃氣不快四肢困倦行步欹側髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中吟々不得卧口燥咽乾太息頭不可以回顧項筋緊急

脊骨強痛頭旋眼黑頭痛噴嚏

生地黃

白木

藿香

黃柏

各二分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

陳皮

吳茱萸

各三分

當歸身

四分

柴胡

人參

炙甘草

地骨皮

各五分

升麻

生甘草

各六分

黃芪

一錢

丁香

一箇

桃仁

三箇

白葵花

右細切作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

○立効散治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花

已上各一兩

右剉如豆大白紙包裹泥固火煨存性為細末每服三錢

○如乾血氣研血竭為引溫酒調服或加輕粉半錢如血

東垣

東垣

崩甚不止加射香為引溫酒調服

○四聖散治婦人赤白帶下

川烏炮

生白礬各一錢

紅娘子三箇

斑蝥十箇

右為細末煉蜜為丸如皂子大綿裹塞陰戶中

○溫經除濕湯治婦人值冬月四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不下降欲為中滿也合眼麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也開目不麻者陽道少行而陰寒之氣暫退也頭眩者風氣下陷於血分不得伸越而作也近火則有之

黃連二分

柴胡

草豆蔻

神麴炒

木香各三分

麻黃根不去

獨活

當歸身

黃柏

升麻

羌活各半錢

炙甘草



人參

白朮

猪苓

澤瀉各七分

黃芪

陳皮

蒼朮

各一錢

白芍藥

一錢半

右細切作一服水二大盞煎至一盞食遠服治肢節疼痛無力之勝藥也

實

○桃

仁散治婦人月水不調或淋瀝不斷後復來狀如瀉水虛弱不進飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉体沉重惟欲眠卧多思酸物

桃仁

去皮尖另研

甘草

半夏

各三

赤芍藥

生地黃

各一錢

澤蘭葉

川牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎

各七分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞空心溫服

寶

○通經下取方曾經試驗神効

海蛤粉

兩半

苦葶藶

牙皂

各二錢半

巴豆

去油

天花粉

苦丁香

紅娘子

各一錢半

射香

右爲細末每用一錢葱涎同搗爲丸薄綿裹以五寸竹管納陰戶中候熱時先通黃水次則經行

寶

○通經丸治婦人室女月經不通或成血瘕疼痛

桂心

青皮

大黃

酒濕洗

川椒

義木

乾姜

川烏

炮去皮

乾漆

碎之炒

當歸

桃仁

去皮去其妙所加泥各等分

右爲細末將四分之一以米醋熬成膏和餘藥末成劑臼中杵勻丸如梧桐子大每服二十九空心淡醋湯下漸加至三四十丸溫酒亦可下性畏寒者入鷄子清和藥內

方良

○膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝不止

阿膠炒成珠

川芎

甘草

炙各半

當歸

艾葉

各七分半

熟地黃

白芍藥

各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服○一方加地榆

黃芩

見胎前門

方良

○加減四物湯治經候微少漸致不通手足煩疼刑瘦潮熱脉

息微數

本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分如經候過多

本方去熟地黃加生地黃如經行身熱脉數頭昏本方加

柴胡黃芩如經行微少或脹或痛四肢疼痛本方加延胡

索沒藥白芷共為末以淡醋湯調下如經候不調心腹疔

痛只用芎歸二味煎服名君臣散以歸倍於芎也

○元戎加味四物湯因氣衝經脉故月事頻併臍下多痛本方

加白芍藥○如經欲行臍腹疼痛本方加玄胡苦練核榔

木香○如經水過多本方加黃芩白朮○如經水澁少本

方加葵花紅花○如經水滴來滴斷或往來寒熱宜先服

小柴胡湯以去寒熱然後以四物湯和之或以二方併服

名柴胡四物湯

○香附一物丸治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭眩惡心崩

漏帶下並宜治之

香附子

片去皮毛不拘多少米醋浸一日夜用瓦鍋煮令熟焙乾

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大日乾每服五十丸淡醋

湯下

○艾附丸治証如前

米一作沫

方良

香附子一斤

艾葉四兩

當歸二兩

右為細末醋糊為丸服

○地黃通經丸治婦人經候不行結成血瘕在臍下如覆杯

熟地黃兩三

重尺去頭

水蛭糯米同炒去米

桃仁各五

右細為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒

下未知加至七八十丸

○益母丸治婦人赤白帶惡露時下不止及治婦人胎前產後

及經中諸般奇病無所不療

益母草

一名荒蔚子紫花方莖俗名野天葵五月除陰乾磨為細末勿化鐵器煉蜜為丸如神子六月除陰乾

丸用熱酒加蜜便化下熱氣者木香易化下或只以未子每服二錢或酒或童便調下此婦人之仙藥也

○苦練丸治赤白帶下最妙

苦練碎酒浸

茴香炒

當歸各等分

聖

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒送下

丹溪活套曰

凡婦人經候不調皆當以四物湯爲主治○如經候過而腹中作痛綿綿無休息者屬血虛本方倍當歸熟地黃蕪氣虛者本方加人參黃芪挾寒者加乾姜○如經候將來腹中陣陣痛乍作乍止者血氣實也本方用生地黃加黃連香附桃仁紅花玄胡索牡丹皮之類○如經水常不及期而行者血熱也本方用生地黃加黃連黃芩白芷之類○如經水常過期而來者瘦人多應是血少本方倍當歸熟地方加黃芪甘草少佐以紅花薤仁泥以爲生血之引用也○肥人大槩是氣虛挾痰阻滯升降然也本方去地黃加參芪甘草茯苓半

夏陳皮香附等藥○常過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛本方用生地黃加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥之類○過期而血淡色者痰多血少也本方用生地黃合二陳湯煎服○肥盛婦人或三二箇月一行者痰盛而軀脂閉塞經脉以道痰湯如芫歸香附蒼白朮之類○如經水適來適斷往來寒熱如瘧者本方合小柴胡煎服○如經行過三五日腹中綿綿走痛者此血行而滯氣未盡行也本方加木香枳櫛煎服立愈

○秘傳經驗秘方治婦人室女月經不通漸成脹滿及治男子墜馬跌撲損傷以致瘀血停積欲成血蠱病者悉皆治之名曰桃奴飲子

桃奴

菴制上微桃乾切不假鼠糞即雄鼠糞也落者冬月及正月收

玄胡索

肉桂

香附米

五灵脂

各炒上

砂仁

薤仁

去皮尖另研

右各等分爲細末每服三錢空心溫酒調下

○一方治月經不通只以鼠糞一合畧炒研細溫酒調下立効

○又方治婦人血崩不止用蒼耳草燒存性好酒調服立止或

調入四物湯中亦効

○一老婦人年五十三血崩久不止諸藥不効予以橡斗蒼耳草根二物燒存性用四物湯加白芷茅花乾姜煎湯調服其經血自此而止再不行矣



婦人科中胎前

論

內經曰陰搏陽別謂之有子

謂陰搏陽搏手其

是爲血氣和平

陽施而陰化也蓋爲人之夫婦猶天地然天地之道陰陽和

而後萬物育夫婦之道陰陽和而後男女生是故欲求嗣者

先須調其婦之經脈經脈既調則氣血和平氣血和平則百

病不生而樂乎有子矣脈經曰診其手少陰之脈動甚者妊

子也蓋手少陰心脈也心主血脈故也又腎爲胞門子戶尺

中腎脈按之不絕當妊子也又曰婦人妊娠一月之時足厥

陰脈養之二月足少陽脈養之三月手少陰脈養之四月手

少陽脈養之五月足太陰脈養之六月足陽明脈養之七月

手太陰脈養之八月手陽明脈養之九月足少陰脈養之十

月足太陽脉養之是以諸經脉各養三十日也若夫至期當養之經歷實不調則胎孕爲之不安甚則下血而墮矣夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少氣多血手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血多安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之固無胎隨之患其或感冒風寒別生異証又宜各按法而調治之機要曰治胎產之病當從厥陰經論之母犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者如傷寒下早之証利大便者則脉數已動于脾利小便者則內亡津液胃中枯燥刺方之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣皆鑿者之繩墨也其爲妊娠之婦早當絕去嗜慾安養胎元性宜靜而不宜躁体宜動而不宜分末宜涼而不宜熱衣宜溫

而不宜寒母久立母久坐母久行母久卧又宜却去一切肥  
甘煎燂油膩辛辣酸水果魚蟹狐兔鴿雀之類却無胎漏  
胎痛胎動下血子腫子癰等証及橫產逆生胎死腹中之患  
矣丹溪曰難產之婦皆是八九箇月內不能謹慾以致氣血  
虛故也傳曰古者婦人妊子寢不側坐不邊立不蹕不食和  
味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲口不  
出傲言夜則令警誦詩道正事則生子形容端正才過人矣  
古所謂胎教也妊娠之婦可不慎歟

附期嗣論

夫人欲求嗣必先視其婦之經脉調否其或未調必以藥而  
調之經脉既調宜以人事副之按其法而行之庶不失其候  
也訣云三十時中兩日半二十八九君須筭落紅滿地是佳

終

期金水過時空霍亂霍亂之時枉費工樹頭樹底覓殘紅但  
鮮開花能結子何愁丹桂不成叢此蓋婦人月經方絕金水  
絕生此時子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時過此  
佳期則子宮閉而不受胎矣然男女之分各有要妙存焉如  
月候方經一日三日五日交會者成男二日四日六日交會  
者成女過此則不孕矣又云陰血先至陽精後衝縱氣來乘  
血開裏精陰外陽內則成坎卦之象而爲男若陽精先入陰  
血後參橫氣來助精開裏血陰內陽外則成離卦之象而爲  
女若胎成三月之內男女未分之時亦有轉女爲男之術其  
法以鉄斧一柄置於妊婦床蓆之下勿令人見知更佩雄黃  
一二兩於妊婦身左或佩萱花亦可已上三法皆驗不可輕  
忽傳曰不孝有三無後爲大古詩云無官一身輕有子萬事

足誠哉是言也無羣者宜深思之無怠

# 脉法

脉經曰婦人三部脉浮沉正等按之無絕者妊娠也○妊娠初時寸微小呼吸五至至三月而尺數也○脉滑疾重以手按之散者胎已三月也脉重手按之不散但疾不滑者俱

五月也○妊娠四月脉左疾爲男右疾爲女俱疾爲生二子○又法得太陰脉爲男得太陽脉爲女○又法左手沉實爲男右手浮大爲女左右手俱沉實微生二男左右手俱浮大生二女○又法尺脉左偏大爲男右偏大爲女左右手俱大生二男狀者如○又法左右尺俱浮當作沉爲生二男不尔則女作男生左右尺俱沉當作浮爲產二女不尔則男作女生也此男女之說也

孕

○婦人懷娠脉離經而浮設腹痛引腰脊為欲生也○又

法婦人欲生其脉離經半夜覺日中即生也○懷娠六七

月脉實大牢強弦緊者生沉細者死○懷妊至六七月暴

下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也○寸口

脉洪而滿洪則為氣滿則為血氣動丹田其形則溫滿在

於下胎冷若冰陽氣胎活陰氣必終洪則為氣者生欲別

陰陽其下必殭假令陽經蓄血若杯陰為死胎問婦人双

胎其一獨死其一獨生醫為下其死者其病則愈然後竟

免軀其脉何以別之師曰寸口脉衛氣平調榮氣緩舒陽

施陰化精盛有餘陰陽俱盛故知双軀今少陰微緊血則

濁凝經養不周胎則偏夭少腹冷痛膝臢疼痛腰重起難

此為血理若不早去害母失胎○婦人經自斷而有軀其

脉反弦恐其後必大下不成胎也

大下謂大下血也

方法

丹溪方法九四條

丹溪曰婦人無子者多由血少不能抷精俗鑿悉謂子宮虛冷投以辛熱之藥煎熬藏府血氣沸騰禍不旋踵或服艾者不知艾性至熱入火灸則下行入藥服則上行多服則致毒谷將誰執

挽一本

○瘦怯婦人子宮乾澁宜滋陰養血四物加香附黃芩之類肥盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行溫燥痰南星半夏川芎滑石防風羌活

一本有蒼朮無防風羌活

或導痰湯之類

○墮胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮耳猶枝枯則果落榦萎則花墜也又曰怨怒傷情內火便動亦能墮胎猶風撼其木人折其枝也火能銷物造化自然病源乃謂風冷傷於

子臟未得病情者也。大抵屬虛屬熱二者。又當視其輕重而治之。

○一婦有胎即墮其脈左大無力重取則瀯乃血少也。以其妙年與補中氣使血自芽濃煎白朮湯調黃芩末一錢服木至三四兩得保全而生。

○固胎飲

熟地黃

歸身尾

人參

白芍藥

白朮

川芎

陳皮

甘草

藥樹上羊兒藤七乘圓者惡惡當作如後藥藥圖者即俗名藥絲也真藥寄生木妙少加黃連黃柏入糯米五七十粒煎服血虛不安者加阿膠珠胎氣痛者加縮砂

○安胎飲孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲



食不美宜服或至五六箇月常服數貼甚好

白朮

當歸

白芍藥

熟地黄 各一錢

人參

川芎

條黃芩

陳皮 各半錢

甘草

砂仁

紫蘇 各三分

右細切作一服水加生姜三片水煎服

○安胎丸

白朮

條芩

神麴 炒各等分

右為細末粥丸每服五十丸清米湯下蓋白朮條芩乃安胎之聖藥也

○丹溪曰天行不息所以生久而無窮蓋壽子活血行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛○條芩白朮乃安胎之至藥俗以黃芩為寒而不用

反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經

而不紊行乃能養胎黃芩必取細槌沉實者用之○縮砂

安胎以其止痛行氣故也月內下血八九月

○懷妊害物乃一截之聖如受酸物乃肝截止能養胎而虛也

○胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之類

○胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱用四物湯加阿

膠珠白木條芩縮砂炒香附炒黑加糯米白水煎服

○又方治胎漏下血

條芩五錢白木一兩砂仁炒阿膠炒成珠

右為細末每服二錢煎艾湯調服水煎服亦可

又方

枳殼炒黃芩各半白木一兩水煎食前溫服

良方

○胎痛宜用當歸地黃湯

當歸 一錢 熟地黃 二錢

右細切水一盞半煎至一盞溫服

產室

○心腹諸痛凡妊婦偶有所傷腹痛不安或從高墜下重物所壓觸動胎元痛不可忍及下血者甚妙

砂仁 不拘多少 和皮畧炒勿令十分焦黑去皮取仁為末熱

酒調服不飲酒者米飲或艾湯鹽湯皆可調服如覺胎中

熱其胎即安矣此方即驗大抵妊婦不可缺此常服安胎

易產

產室

○凡妊娠二三箇月忽心腹疼痛不安用

當歸 三錢 阿膠 二錢 甘草 二錢 葱白 四錢

右細切分作二服每服用水貳盞煎至一小盞溫服

寶產

○九妊婦四五箇月忽心腹疔痛

大棗十四枚 煑令黑 鹽一錢燒令赤

右為末取一撮許酒調服之立愈

寶產

○治妊娘心腹大痛氣歎絕者

川芎 川歸 茯苓 厚製朴各一兩

右細切作一服用水三升煎至一升分二服立飯而愈

寶產

○川芎散治婦素有冷氣冲心如刀刺者

川芎一錢 人參 吳茱萸各半錢 茯苓

桔梗各四分 當歸一錢 制朴半錢 芍藥七分半

枳殼 炙甘草各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞稍熱服

寶產

○妊娘腰痛如折不能轉側

鹿角

半兩

右以火燒令赤酒淬再燒再淬以碎為度細末酒調服

○治妊娘腰脚腫痛

白茯苓

白朮

乾姜

甘草

炙各一錢

杏仁

三錢去皮尖研

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○胎腫謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬濕多或用

山梔子一合炒為末米湯調下九服亦可

○惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治用二陳湯

之類○又方以白朮為丸服

一曰肥人是痰瘦人是熱

○半夏茯苓湯治惡阻不食吐逆頭眩四肢怠墮煩疼惡汗

半夏

湯炮七次透過心  
姜汁拌炒黃色

生姜

各一錢

茯苓

七分

熟地黃

陳皮

桔梗

全覆花用先救不

人參

芍藥

甘草

川芎各半錢

右細切水煎空心服○千金方有紫蘇細辛各半錢

千金方  
醫按

○一婦孕兩月嘔吐頭眩鑿以參朮川芎陳皮茯苓服之愈重  
脉弦左為甚此惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆  
又挾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸二十  
四粒五服稍安脉畧數口苦乾食即口酸意其膈間滯氣  
未盡行以川芎陳皮梔子生姜伏令煎湯下抑青丸十五  
粒而愈但口酸易飢此肝熱未平以熱湯下抑青丸二十粒  
愈後兩手脉平和而右甚弱其胎必墮此時肝氣既平可  
用參朮以防之服一口而胎自墮矣

良方

○參橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶

方良

橘紅

茯苓

各一錢

麥門冬

白朮

厚朴

姜制

甘草

炙各半錢

右細切作一服加生姜三片竹茹一錢或加人參一錢水一盞煎七分溫服

○小膠艾湯治妊婦因頭仆挫跌胎動不安或胎墮上逼心或

腹痛血下

阿膠

炒成珠

艾葉

二兩

指迷方加秦艽

一兩

右克細末用水三升煎至一升半分三服

○膠艾湯不問月數淺深安胎及妙及二本作極

熟地黃

艾葉

當歸

甘草

炙

川芎

阿膠

各半錢

黃芪

二分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

寶產

○治妊娘下血不止胎上冲心四肢厥冷悶仆欲死

阿膠炒

艾葉各一兩

竹茹如奉大

白砂蜜二合

右用水二升煎至一升入蜜更煎一二沸分二服

產

○治妊娘下血如月信來者若致胞乾非特損子亦用損母能

熟地黄

乾姜炮各一兩

右為細末每服三錢一日夜三四服

寶

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如水如豆汁

者

野苧根炒

金根各一兩

右用水酒各一盞煎至一盞去粗分作二服不拘時服

寶產

○胎動冲心煩悶欲死安胎止痛

當歸酒洗

川芎

人參

阿膠炒



產寶

甘草

炙各一兩

葱白

切一升

右用水七升煎至三升分三服

○妊娠因舉重仆跌損傷胎氣不安或子死腹中

川芎

一兩

右為細末每服一匕連進三服死胎即下

○治妊娠遺尿失禁

白薇

白芍藥

各等分

右為細末酒調方寸七日三服

○子煩 妊娠苦煩悶不安又曰心煩熱悶謂之子煩

麥門冬

伏令

防風

知母

各一錢

右細切作一服用水二盞煎至一盞入竹瀝一二匙服

○犀角散治子煩

方良

犀角屑

地骨皮

條芩

麥門冬

赤茯苓

各一錢

甘草

半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞入竹瀝一合溫服

○當歸飲治子煩

當歸

一錢半

川芎

阿膠珠

豆豉

桑寄生

各七錢半

葱白

七莖

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○竹瀝湯治子煩

竹瀝

一合

防風

黃芩

麥門冬

各一錢

白茯苓

一錢半

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗入竹瀝再煎數

沸溫服

金匱

良方

○產寶澤瀉散治妊娘氣壅身體腹脇浮腫喘急氣促小便閉  
澁不利謂之子滿

澤瀉

桑白皮

枳殼麸炒

枳櫛

木通

赤茯苓

各等分

右細切每服四錢加生姜五片水一盞煎八分溫服

○張仲景曰婦人本肌肉肥盛頭舉自滿今反羸瘦頭舉中隆  
胞系了戾亦多致此病但利小便即愈宜服腎氣丸蓋藥  
中有茯苓故也地黃為君功在補胞

○木通散治妊娘身體浮腫四肢脹急小便不利謂之子腫

木通一錢

木香

訶子皮各三分

香薷一錢

枳殼

炒半錢

枳櫛半錢

桑白皮一錢

條芩半錢

紫蘇葉

一錢

產寶

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○全生白木散治妊婦面目虛浮肢體腫脹名曰子腫

白木

一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

伏苓

各半兩

指迷方用伏苓皮多朮白皮無木

右為細末每服二錢米飲調下

○鯉魚湯治妊娠腹脹滿或通身浮腫小便不利或胎死腹中

此方甚驗

當歸

白芍藥

各一錢

白伏苓

一錢半

白木

二錢

通紅

半錢

鯉魚

一尾不約大小

右細切作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞

七半生姜也片煎至一盞空心服當見胎水下如水去未盡

或胎死腹中脹悶未除再合一劑服之水盡脹除為度

局方

○紫蘇飲治胎氣不和，癰上心腹脹滿，寒痛，謂之子懸。

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

紫蘇葉

當歸

各六分

人參

甘草

各三分

右細切，作一服，加生姜三片，葱五莖，水煎服。

寶產

○天仙藤散治妊娠三月成胎之後，兩足自脚面漸腫至膝行步艱難，喘悶妨食，若水腫甚至足指間有黃水出者，謂之

子氣。

天仙藤

洗淨畧炒即青木香藤也

香附子

炒

陳皮

甘草

烏藥

木香

各等分

右細切，每服三錢，加生姜三片，紫蘇五葉，水煎，日三服，腫

消止藥。

寶產

○安榮散治妊娠小便澀少，遂成淋瀝，謂之子淋。

寶產正傳

卷之七

一

室

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心草

甘草

各五錢

人參

川芎

各一兩

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調下○此方恐滑石太重而滑胎若胎臨月可用若六七箇月已前俱不可輕用且去此味或加梔子篇蓄石榆之類最穩瞿麥亦恐損胎不可用也

驗錄

○地膚子湯治子淋小便澀數

地膚草

與芥菜相似俗名白地芎

車前子

各一錢

知母

去毛炒

黃芩

赤茯苓

白芍藥

枳殼

麩炒黃色各七分

升麻

通草

甘草

各三分

驗錄

○又方治子淋

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

外臺

地膚草四兩右以水四升煮取二升分三服或新耳地膚草搗取自然汁服亦可不獨治子淋九小便淋閉服之無不効驗

○冬葵子散治子淋小便澀痛胎動不安

冬葵子炒

柴胡去芦

桑白皮

赤茯苓

赤芍藥

當歸各等分

右細切每服四錢水一盞半加姜三片葱白七寸煎至一盞去粗溫服

外臺

○車前散治子淋或小便不通下焦有熱

楸柳

木通

陳皮去白

赤茯苓

車前子

赤芍藥

當歸

滑石

石簪

炙去毛

列基

右各等分每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

○忘憂散治妊婦心經蘊熱小便赤澀不利淋瀝作痛

琥珀不拘 薑草根一握

右以琥珀研為細末每服半錢濃煎服

眩倒

方局

○葛根湯治妊娘臨月忽發風瘕悶亂不省人事吐逆睡少時醒後復發謂之子痼

貝母

葛根

牡丹皮

防已

防風

當歸

川芎

桂心

茯苓

澤瀉各半錢

甘草炙二分半

獨活

石膏

人參各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服日三服其貝母令人易達未臨月者以升麻代之忌松菜



方局

○防已湯治姪娠中風口襟四肢強直角弓反張

防已 五錢 羌活 一錢半

右為細末別用黑豆一合炒焦黑投好酒中沸定去豆調藥末斟開口灌之稍醒再灌有效

方局

○消風散治姪娠頭旋目眩視物不見顯頰腫核

石膏 煨 甘菊花 去萼 防風 去芦 荊芥穗

羌活 羚羊角 銹 川芎 大豆黃卷 炒

當歸 酒浸 白芷 各半錢 甘草 二分半

右細末作一服加茅茶半錢水一盞半煎至一盞食後服

方局

○天門冬飲治姪娠外感風寒久嗽不已謂之子嗽

天門冬 紫苑茸 知母 去毛 桑白皮 蜜炙各一

五味子 桔梗 去蘆各半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞嗽血者加阿膠半錢

大便澀者加苦亭歷子半錢

○百合散治妊娠咳嗽心煩不欲飲食

百合

紫苑茸

麥門冬

桔梗去蘆

桑白皮錢一

甘草半錢

竹茹一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞入蜜半匙再煎二三

沸去粗溫服

○丹溪參朮飲治妊娠轉胞娠

四物湯加

人參

白朮

半夏湯泡透

陳皮

甘草

右細末加姜水煎服

○丹溪曰轉胞之証胎婦之稟受弱者憂悶多者性急躁者食

良方

味厚者庸或有之古方皆用滑利藥鮮有應效曰思胞不自轉爲胎所壓轉在一邊胞系了矣不通耳胎若舉起居於其中胞系自踈水道自利夫胎之墜下必有其由吳宅寵人患此兩手脉似瀉重按似弦左稍和予曰此得之憂患瀉爲血少氣多則胎氣弱而不能舉弦爲有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下乃以已上藥與服隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣寔安與之次早亦然至八貼安猶恐此法偶中後又治數人亦效

○安胎散治妊娠胎寒腹痛胎熱多驚舉動腰痛腹滿胞急卒有所下或因頸仆閃肭或食毒物或感冒時疾寒熱往來致傷胎藏並皆治之

川芎

枳殼麸炒黃熟地黃

三錢

糯米 一合

廣產

○如聖散治姙娠腹痛胎動不安  
右細切作一服水一盞半生姜三片大棗一枚更加金銀  
三五錢同煎至一盞溫服

鯉魚皮

當歸

熟地黄

阿膠

炒成珠

白芍藥

川芎

川續斷

酒浸

甘草

炙各等分

方良

○加味四物湯治姙娠下血不止  
右細切每服四錢水一盞半生姜三片苧麻根半錢許煎  
至一盞溫服○一方加乾姜竹茹无續斷

本方加艾葉

三十片

阿膠珠

一錢

方良

○芎根湯止血安胎  
右細切每服四錢水一盞半加烏梅肉少許同煎至一盞  
熱服連進三四服即止

方良

野苧

二兩

用酒水各一盞入金良同煎至一盞溫服銀

○桑寄生散治妊娠下血不止胎動不安

桑寄生

川歸

川續斷

川芎

香附子

阿膠

炒

扶神

白朮

人參

甘草

各半錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

方良

○羚羊角散治妊娠中風頭項強直筋脉掣急言語蹇澁痰涎

壅盛或時發搐不省人事謂之子癰

羚羊角

鎊獨活

酸棗仁

炒

五加皮

各八分

薏苡仁

防風

當歸

川芎

扶神

杏仁

各四分

木香

甘草

各二分

右細切作一服加生姜三片水煎服

○歸涼卽命散治妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹等証

川芎

苧根

白芍藥

麥門冬

川歸

白木

糯米

荊芥穗

甘草

各半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞入密一匙服

○白扁豆散治妊娠誤服草藥及諸般毒藥毒物

白扁豆

生去皮

右爲細末清米飲調方寸匕神效

○芎藭補中湯養新血去瘀血補虛扶危

阿膠珠

五味子

乾姜

各四分

黃芪

蜜炙

川歸酒浸

白木

川芎

赤芍藥

各七分

人參

杜仲

炒

甘草

炙各三分

方良

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服後有一方名同  
多木香治小產

○當歸芍藥湯治妊娠下痢赤白腹中疝痛

白芍藥一錢

當歸

白茯苓

澤瀉

白朮

條芩各半錢

甘草

黃連

木香

枳殼各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如白痢腹痛  
甚者恐有寒也去芩連加乾姜三分

○芎朮香連丸治証同前

阿膠珠

白朮各五錢

乳香

木香各二錢半

枳殼

芎朮

乾姜各二錢

黃連

一兩

砂仁

炒

川芎

各五錢

產

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸白湯下

○治妊娠泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛由食瓜果生冷等物及當

風取涼所致者

訶子皮

煨

白木各一錢

陳皮

良姜

炒

木香

白芍藥

酒炒

炙甘草

各半錢

肉豆蔻

麩炒

煨

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

產

○芎藭散治妊娠外感風寒渾身壯熱頭目眩運

紫蘇葉

川芎

白芍藥

白朮

麥門冬

陳皮

乾葛

各六分

甘草

三分

右細切作一服加生姜五片葱白三寸水一盞半煎至一

盞溫服不拘時候

方

○升麻六物湯治妊娠六七箇月傷寒壯熱或發赤斑變異



升麻 二錢

枳子

杏仁

大青草

少草

甘草 各一錢

右細切作一服加葱白三寸水一盞半煎至一盞溫服

○妊娠傷寒百劑疼痛壯熱不急治即落胎

柴胡

乾葛

知母

石膏 各六錢

大青 八錢

枳子 一兩 升麻 八錢

葱白 十四華

切 右細用水七盞煎至三盞半分四服

○傷寒安胎

白朮

黃芩 各等分新瓦上炒令香

右細切每服三錢加生姜三片水煎服

○治妊娠傷寒

柴胡 一錢

前胡

當歸 各七分

人參 四分

芍藥

生地黄

各六分

甘草

三分

右細切作一服加生姜三片葱白三莖水一盞半煎至一

盞去粗溫服

○催生散治妊娠傷寒熱病胎死腹中身冷唇青不能自出

蒼朮

一錢

桔梗

半錢

橘紅

三分

白芷

桂心

去皮

甘草

炙各一分

當歸

酒洗

乾姜

炮

厚朴

芍藥

半夏

炮透

川芎

枳殼

炒各二分

南木香

杏仁

炒另研各一分

右細切作一服水一盞半加生姜三片大棗一枚煎至一盞

溫服未下再進一服

○治妊娠咳嗽

紫苑茸

麥門冬

各一分

桑白皮

蜜炙

杏仁

炒去皮

炙甘草

各二錢 桔梗 去知母三分

右細切加生姜三片竹茹一塊彈子大用水一盞半煎至

一盞去粗入白蜜一蛤殼許再煎數沸溫服

○妊娠痰嗽見紅

歸身

熟地黄

天門冬

麥門冬

紫苑

各半錢

桑白皮

蜜炙

杏仁

甘草

炙

桔梗

片黃芩

五味子

阿膠

炒成珠各二錢半

右細切作一服痰盛加竹茹一團水煎入小蘗汁同服

○小產後下血不止

人參

黃芪

當歸

白朮

白芍藥

艾葉

甘草

炙

阿膠

炒

川芎

青皮

香附

砂仁

右各等分白水煎服

○小產後心腹疼痛

當歸

川芎

熟地黄

白芍藥

各一錢

玄胡索

七分

桃仁

去皮尖  
研細

紅花

各三分

香附子

青皮

炒黑

澤蘭

牡丹皮

各半錢

右細切水一盞半入童便酒各半盞煎至一盞溫服

○安胎湯治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎元

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米桑寄生白

水煎服

○治兒在腹中呌哭

用多年空屋下鼠穴中土一塊令妊婦禽之即止

○又方用黃連三五錢濃煎汁特特呌下自止

一云臍帶上疙瘡乃兒口中含者因妊婦登高取物脫出

兒口以此作聲令妊婦曲腰向地拾物使兒復得含入口

中即止

○丹溪東胎丸至七八箇月內服之

黃芩

炒夏一兩秋七錢冬五錢

白朮 二兩

茯苓 七錢半

陳皮

三兩不見大

右為細末粥丸如梧桐子大每服三四十丸白湯下

○達生散孕至八九箇月內服十數貼甚好易產腹少痛

大腹皮

原本三錢恐太多今用一錢先批按令淨用酒洗

人參

陳皮

紫蘇 連莖葉

白芍藥

白朮

當歸 各一錢 甘草 炙二錢

右細切作一服外入黃楊腦七箇食少胎瘦者不須用葱五葉夏加

黃芩黃連五味子春加川芎防風秋加澤瀉冬加砂仁或通加枳殼砂仁胎動不安加金銀三五錢野苧麻根一錢氣上逼心加紫蘇地黃性急加柴胡多怒或加黃芩佐之食少加砂仁神麴渴加麥門冬黃芩能食倍加黃楊腦此能瘦胎有痰加半夏黃芩不長

○臨月用以養胎方

當歸

川芎

黃芩

陳皮

白朮

香附各一錢

白芷半錢

并草二分

右細切水煎調益元散一錢服虛者加人參七分

○催生散

白芷

炒焦黑

百草霜

白滑石

各等分

右為細末煎芎歸湯調下二三錢

婦科

○紅芩、萊菔、馬齒莧俱能墮胎。妊婦切忌臨產用以催生，煮食亦效。

婦科

○難產多是氣血虛，亦有氣血凝滯而不能轉運者，亦有曰八九箇月內不能謹愆者。

婦科

○難產多見於安逸靜悶之人，富貴奉養之婦，其貧賤者未之有也。古方瘦胎飲本為潮陽公主設，蓋以其奉養厚而氣實，故為此方以耗其氣，使氣血和平而易產耳。非至論也。

婦科

○金匱當歸散安胎養血清熱，孕婦時常宜服。

當歸

川芎

芍藥

白朮

條芩

各等分

右為細末，每服二錢，溫酒或湯調服。

婦科

○金液丸治橫生倒產。

金液丸

卷之七

八

飛生毛

者尤佳 火燒樹下脈

血餘

無病女人髮燒灰

公母羊糞

已上各半錢

伏龍肝

一錢

黑鉛

三錢用細子火土上鎔後水銀半錢急攪結成砂子頭出細研

右為細末用粽子尖為丸如棗葢大遇難產以順流水送下五丸兒身自順而正產子母俱活矣

○催生鉛丹治橫生逆產

黑鉛一錢

右以小銚子火上鎔化投入水銀二錢急攪結成砂子傾

傳異作持

出用熟絹紐作丸子如棗葢大臨禱以香水送下立產

○如神丹治難產用巴豆三枚草麻子七枚各去殼研入射香少

許捏作餅子貼臍

詩曰巴三草七脫衣裳

細研如泥入射香



寶產

捏作彈丸臍下貼 須臾子母便分張

○催生如聖散用黃蜀葵子不拘多少

右為細末每服二錢熱酒調下如不飲酒熱湯調亦可或

以蜀葵花焙乾熱酒調下一錢亦效

詩曰黃葵子妙有餘粒 研爛酒調濟君急

若還臨危難產時 免得全家俱哭泣

寶產

○香桂散下死胎

射香另研 官桂 三錢為末

右件和勻作一服溫酒調下須臾即下

○來避散治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事

木香不見大 神麴炒 陳皮去白 麥蘖炒

黃芪去蘆 生薑切碎 阿膠炒成珠 白芍藥各半錢

糯米半合

苧根一錢

甘草三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗幹開口漚下未

醒再煎一服連接灌之即甦

產寶

○霹靂奪命丹治臨產未產之時目翻口噤面黑唇青口中沃沫子母俱殞命在須臾若兩臉微紅子死母活急用此藥

救之

蛇退

一條瓶

千里馬

路上左足草鞋一隻燒灰

金銀鉞

各七片

髮灰

一錢

蚕退紙

燒一錢

乳香

五錢

黑鉛

七錢

半用半水

成

右共為細末以攢猪心血和丸如梧桐子大每服二九倒

流水送下如灌不下化開灌之脩合此藥時勿令婦人孝

子鷄犬見之

產寶

○無憂散治分免難產及胞衣不下等証孕婦臨月預服此藥

寶產

日進二服則子易生而胞易落也

當歸酒洗

川芎

白芍藥各七木香不見火

甘草各五分

枳壳麸炒黃色

乳香各一錢血餘灰四分

右為細末分作二服水一盞煎八分濾去粗溫服不拘時

○催生奪命如神丹

牡丹皮

枳壳麸炒

赤芍藥各一錢蛇退二錢

青皮

阿膠珠

甘草炙五加皮

芸臺子

管眾

馬鳴退炙焦各半錢

花蕊石

大楓半錢乳香一字另研

右為細末煉蜜丸如彈子大臨產細嚼一九棗湯送下未

產小頃又嚼一九以產為度

行

○芎歸湯一名佛手散治妊娘因事跌仆子死腹中惡露妄下

方

寶產

疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若子死腹中立便逐下  
若腹痛隨止子母俱安又治臨產難生胞衣不下及產後  
血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中血刺疔痛  
血滯浮腫入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭  
痛或似癰非癰一切胎前產後危急狼狽畜死等証並皆  
治之

當歸酒洗去苦  
一兩

川芎七錢

右細切分作四服每服用水一盞煎水將乾棧酒一盞半  
煎五七沸溫服如口噤幹開灌之如人行五里許再灌  
此四服便省立產神驗

○奪命丹治胞衣不下蓋兒之初生惡血流入衣中衣爲血所  
脹塞故不得下須臾冲上逼心即死急服此藥

黑附子

炮半兩

牡丹皮

兩一

乾漆

二錢半研細少

右為細末用米醋一升大黃末一兩同煮成膏和前藥末為丸如梧桐子大每服五七丸溫酒下

○黑龍丹治難產及胞衣不下血迷血暈等証

賞歸

五灵脂

川芎

良姜

生地黄

已上各二錢細切入雞子壳內炒

百草霜

一兩

硫黃

乳

各二錢

琥珀

花鹿石

各一錢

右件連前藥共為細末酒米糊為丸如彈子大如用時將一二丸仍用火煨紅為末以童子小便合酒調灌下垂死者灌三四丸即活其功不可尽述

○一方治胞衣不下

川牛膝 二錢 當歸 一錢半 木通 三錢 滑石 四錢

黃葵子 二錢半

右用水煎連進三四服立下

○枳殼散妊娠八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑胎易產安

和子臟益血舒氣

枳殼 正兩錢 黃色 粉甘草 炙一兩半

香附子 一兩 炒

右爲細末每服二錢空心沸湯點服日進三服一方加糯

米炒同爲末白湯點服令兒易產初生胎氣微黑百日後

肥白此爲古方之冠若妊婦稍弱者單衣恐胎寒腹痛胎

弱多驚於內加當歸一兩木香半兩不見火如此用之則

陽不致強陰不致弱二氣調和有益胎嗣

○自妊娠初得以至臨月藥石禁忌歌

歌曰蛇蛭水蛭及蠱虫

烏頭附子與天雄

野葛水銀并巴豆

牛膝薏苡連蜈蚣

三稜代赭芫花射

大戟蛇蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂

槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草

瞿麥乾姜蟹甲瓜

硃砂乾漆蕪桃仁

地膽茅根莫用好

○飲食禁忌

雞肉合糯米食令子生寸白虫○食犬肉令子無声○鮓

鯉同雞子食令子生疳蝕瘡○食兔肉令子缺唇○食羊

肝令子多厄難○食鯨肉令子項短縮頭○鴨子與桑椹

同食令子倒生心寒○鮮魚同田雞食令子瘡痂○雀肉

同豆醬食令子面生雀斑點○食螃蟹橫生○食姜牙

令子多損○食水漿令絕產○食雀肉飲酒令子多淫無  
恥○食茨菰消胎氣○食駝馬肉過月難產○豆醬合霍  
萊食墮胎○食山羊肉令子多病○鰕鱗無鱗魚難產○  
食諸般菌生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目○勿妄  
服湯藥勿妄亂針灸勿過飲酒漿勿舉重登高陟險心有  
大驚子必癲癇勿多睡卧須時時少步動和血脉勿勞力  
過傷使腎氣不足子必解顱腦破不合○衣母太溫食母  
太飽若脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病戒之戒之

○臨產須知

○一臨月不可洗頭以免橫生逆產

○一懷妊十月已滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏陷腰  
間重腹穀道挺迸漿水淋下其兒遂生此乃正產若當生



自有其時如瓜熟蒂懸栗熟自落之類

○一凡臨產宜擇年高有識穩婆及純謹婦人三四人扶持一應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜杜絕勿令觸犯胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主傷害

○凡臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生

一月歲滿足方覺腹痛不可驚動太早早則舉家霍亂卜筮問神巫覡之流祇說鬼神多方哄嚇媒利產婦聞之恐怖夫恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產如犯此急宜服紫蘇飲以寬其氣

一凡臨月忽然腹痛或作或止或一日二日三五日胎水已來腹痛不害者名曰弄痛非當產也又有一月前忽然腹痛如欲便產却又不產者名曰試月非當產也不問胎水

來與不來俱不妨事但當寬心候時若果當產時腰腹痛極不已穀道挺進眼中火出其時便產豈有或痛不痛欲產不產之候耶人多於此胡行亂做枉了性命可不慎歟  
一凡初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且扶行熟忍若行不得則凭物而立行得又行

一世人不識但見腹痛總作便謂生產坐婆踈狂者不候時至便言試水試水併胞漿先破風入產戶以致腫脹門戶狹小乾澁難產

一將產之時產母甚痛不肯舒伸行動固執曲腰眠睡胎元轉動尋到生門已被遮閉又轉又尋弄三胎已無力決至難產

一初覺不痛且當任意坐卧勉強飲食毋致臨產乏力

一凡產母初覺欲生便須惜力調養不可妄亂用力兒身方轉便被用力一逼令兒錯路以致橫逆須待臨到產門用力一逼兒即下生此所當用力也譬如登廁時候未至用力何益

一凡產母如覺心中憤悶可取白蜜一匙溫水調服

一產母如覺饑餓可進以軟白粥不令飢渴以致乏力亦不可食硬飯糗粽恐產後有傷食之病

一未產之先或煩渴欲飲水只可與清米飲飲之爲佳

一凡產不可服催生符水況血得寒即凝血一凝則胎滯而反致難產夫催生符竅蓋是野道士求食媒利之說有何益哉

一凡產婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一二時後生不

便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞內養兒之水也兒既折胞其水既下胎隨水而下則為易生胎元無力轉頭遲慢漿下即血來閉塞道路令子無路可通故難產也如用令蜀葵子等破血之藥逐去惡血兒兒得路而生故曰催生藥也

鬼腦

筆頭灰

努牙

蛇退之類是也

二片催生若見水血先下子道乾澁不能下者如

猪脂

油

蜜

酒

葱白

葵子

牛乳

榆白皮

滑石之類是也

三片催生若稽停勞力之久風冷乘虛入於子宮使氣血凝

滯而難產者如

牛膝

葱

桂

五積散

順元散之類

四九催生有觸犯惡氣心煩燥悶難產者如

射香

朱砂

乳香

青竹茹之類

○夫產育之難者皆由產婦不曾預聞講說生育道理臨事倉惶用力失宜遂有難產之危是故有逆產者則先露足有橫生者則手露坐產者則先露其臂此皆用力太早之過夫當臍腹疼痛之初兒身繞轉而未順用力一遍遂致橫逆若手足先露者用細針刺兒手足心一二分深三四刺之以鹽塗其上輕輕送入兒得痛驚轉一縮即順生之矣或兒腳先下者謂之踏蓮花生急以鹽塗兒腳底又可急搥之併以鹽摩母腹上則正生矣

○灸法治難產及胞衣不下急於產母右腳小指尖頭上灸三壯炷如小麥大立產

○凡橫倒難產用蛇蛻一條全者蚕退紙一方右以二物入新  
甕篋中益泥固濟燒存性爲末煎榆白皮湯入乳香同調  
服下則順生

○又方治橫生先露手足

阿膠

炙

滑石 一兩

冬葵子 一合

酥油 一兩

每服四錢水一大盞煎至七分連進二三服

○又方治橫逆不順子死腹中用

伏龍肝

壯心紅土也

右爲細末溫酒調下一二錢其兒頭

戴土而出甚驗

○礙產

凡兒身已順門戶俱正兒已露頂而不能生此因兒身回  
轉肚帶牽住兒肩不能下也治法急令產母仰臥輕輕推

產一本  
作令

此名  
偏產

兒向上徐徐引手以中指按兒肩下其臍帶須候兒身正  
順產母用力一送兒即下生○又法令穩婆款款分開臍  
帶外將紙撚

○凡兒身向未順生路未正被產母用力一逼令兒偏生或左  
腿或右腿或臀或左右額角雖兒身已逼產門而不能下  
但云兒已露頂非頂也治法當令產母仰卧看生人輕輕  
推兒近上以手正其頭用力一逼即下若是頭之後骨偏  
拄穀道兒則露額當令看生人以綿衣炙令溫暖裹手急  
於穀道外傍輕輕推兒頭令正然後用力一送兒即下生  
○治盤腸產法 有臨產則子腸先出甚可驚恐治法以盆盛  
溫水溫潤其腸令產母仰卧且以言語安慰其心却用好  
米醋半盞和新汲水七分攪勻忽喚產母面或背則打頓

而收每一嚙令一縮三嚙三縮腸則盡收矣合用參芪歸  
芎等大劑補藥加升柴防風之類以升舉之未有不安者  
也○又法急以草麻子去殼研細貼產母顙頂上即收

○一方治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥

六兩

通草

三兩

桂心

三兩

牛膝

四兩

榆白皮

四兩

一方無榆白皮有天花粉四兩大能隨胎右  
細切用水九升煎取三升去粗分三服頓飲即下

○又方牛膝丸下死胎

壯

杜牛膝

三兩

紫金藤

七錢

肉桂

二錢

當歸

四錢

蜀葵根

七錢

射香

半錢

右爲末米糊爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服五十九丸  
香湯送下



○又方治子死腹中不出

用黃牯牛尿不拘多少塗母腹上立出○一云以牛屎炒令大熟入醋半盞以青布包裹於母臍上下熨之立下  
○又治子死腹中用雞子黃一箇生薑自然汁一合調勻頓服分免後用芸薹粥補之

○生子下血過多子死腹中增寒手指甲青面色黃黑胎上搶心悶亂欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷胎下血不止胎尚未損可安若已死即下極妙

牡丹皮

赤芍藥

桂心

薤仁

白茯苓

右各等分爲細末練蜜爲丸如彈子大每服一九細嚼淡醋湯送下連服數丸立驗

○一方治胞衣不下

川牛膝

三錢

當歸身尾

二錢

木通

三錢

滑石

四錢

冬葵子

半錢

右細切水煎連進二三服即下

○丹溪活套

凡婦人胎前諸疾只須以四物湯爲主治看証加減調治  
○如覺腹中煩悶口苦厭食不問月數多少本方加白朮  
條芩砂仁煎服○如五六箇月後胎動不安或逆搶逼心  
本方加阿膠艾葉砂仁枳殼條芩白朮野苧根入金銀同  
煎服○如氣血虛心煩脉虛大無力或忪怔手軟及時有  
微熱本方加人參白朮黃芩甘草酸棗仁遠志麥門冬地  
骨皮等藥○如五六箇月前無故下血或因事下血謂之  
漏胎本方加條芩白朮甘草白芷茅根地榆葉寄生之類

○如七八箇月前後面目及四肢浮腫本方加茯苓澤瀉  
白朮條芩炒梔子厚朴甘草稍麥門冬之類○如孕中忽  
然口噤吐沫不省人事言語錯亂本方合二陳湯加麥門  
冬竹茹遠志石菖蒲之類○如感冒風寒頭痛發熱或身  
體疼痛本方合小柴胡湯或更加細辛白芷防風羌活等  
藥○如二三箇月內嘔吐惡心不納飲食謂之惡阻本方  
去地黃加陳皮半夏麴砂仁神曲藿香麥芽陳蒼米白朮  
之類○或因事動胎致胎不安動撞不已及下血欲墮本  
方加人參白朮白茯苓條芩白芷桑寄生砂仁阿膠珠甘  
草等藥○或時有白濁白帶本方加白茯苓陳皮蒼朮半  
夏麴牡蛎龍骨之類○如無故腹痛瀉利清水或發熱胎  
動不安本方加白朮茯苓澤瀉蒼朮訶子皮砂仁神

神

由章之焚

○祖傳經驗秘方治難產瀝漿胞乾胎不得下用香油蜂蜜各

一碗和勻用銅鈔慢火煎一二沸掠去沫調白滑石末一兩重攪勻頻服外以油蜜於母腹臍上下摩之立產

○又方催生曾試甚驗用兔頭骨家猫頭骨各一箇烈火煨地上出火毒研爲極細末每服二三錢濃煎芎歸湯調下即產

○又方治胞衣不下三退飲

蛇退

一條全者

蚕退紙

一方

蟬退

四十九箇

用麤瓶盛燒存性細研順流水調服立下

論

婦人科下產後

內經曰一息不運則機絨窮一毫不續則穹壤判所謂氣血周流循環無端少有不續則身危矣若夫妊娠之婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自能用手折胞求路而出既出胞外母子分體呼吸殊息其可久羈於內而使其氣化不運不續哉夫胎元壯健者胞既折即隨漿而下故易產也其困弱者轉頭遲緩胞漿既乾汚血來塞道路凝滯是以橫生逆產子死腹中而產母之命死在須臾可不畏乎凡見將生之際胞漿既下喻時尚未分兌便當傍惶設計用藥逐去惡血使子路通暢而無難產之患豈可袖手以待斃哉是故催生之藥即芎歸

惶一本  
作懼  
者

益母草冬葵子之類皆使之逐去汚血者也若腰腹未甚痛  
漿水少淋瀝而下名爲試漿實非胞內真漿也且宜寬心守  
待切不可輕易便令穩婆接取產母用力逼胎太早多致橫  
逆不順切須謹慎其或先見手足不順者額偏露者但當以  
手輕輕撲正以待其自下可也若分免之後胞衣未下者猶  
爲可慎宜多方用藥逐下甚不可令粗率之婦摘取嘗見有  
斃破尿管致終身之害者有取下肝葉而產母隨時殞命者  
可不謹與若夫難產之婦皆是產前恣欲所致非獨難產且  
產後諸疾皆由是而生焉或有乍寒乍熱似癰非癰或大熱  
頭疼體痛如傷寒狀或卒中口噤如瘡如癰或左癱右瘓角  
弓反張或妄言見鬼心神惶惑或耳目口鼻忽覺黑氣如烟  
薰之狀或腹中作痛綿綿不絕已上諸証若非惡露未盡即

脉法

是勞傷血氣大虛之証丹溪曰凡產前當清熱養血爲主產後宜大補氣血爲要雖有雜証以未治之此萬世不易之確論也雖然亦有離得太早或燥浴身垢以致感冒風濕或多啖雞子穢粽難消之物皆能惡寒發熱變証多端醫者宜至邪心診察脉候以扶危拯急不可苟且妄治以夭折人之天也

脉經曰新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱冒三者大便

難

云

師曰亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脉微弱嘔

不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥上而必冒

上家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所

以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復

所以便堅者嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食七八日

而更發熱者此為胃熱氣實承氣湯主之

婦人產後七八日無太陽証小腹堅痛此為惡露不盡四五日

不大便趺陽脉微實厚倍其人發熱日晡所煩躁者譫語不

能食利之即愈宜承氣湯以熱在裏結在膀胱也

按丹溪曰產後宜大補氣血為主雖有難証以未治之又曰產後不可汗下和以仲景治傷寒法用承氣小柴胡等

藥數退盡後之熱恐非至到可法之語姑述於此以與賢者共議而採擇之可也

丹溪曰產前脉細小產後脉洪數皆死又曰產前脉當洪數既

產而洪數如故豈得不死此亦大藥言之今見產後豈無脉洪數而生者

方法丹溪方法凡一十條

丹溪曰產後當大補氣血為主雖有難証以未治之

○產後補虛用參朮黃芪陳皮歸身尾川芎炙甘草如發熱輕

則加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾姜或云大熱而用乾



姜何也曰此熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳蓋乾姜能入肺分利肺氣又能入肝分引聚熱生血然必與補陰藥同用之此造化之妙非天下之至神其熱能與於此哉

產後發熱惡寒或口眼歪邪等証皆是血氣虛甚當以大補氣血爲主治左手脉不足補血藥多於補氣藥右手脉不足補氣藥多於補血藥切不可用小續命湯表散之劑

○產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若腹不滿者非惡血也

○產後不盡小腹作痛各兒枕痛用五靈脂香附爲末醋糊丸甚者加搗失桃仁一云用神麴糊丸白木陳皮湯下氣虛者四君子湯下

○治血刺痛用當歸乃和血之法若因積血而刺痛者宜桃仁

紅花當歸頭之類

血在下焦當用歸尾

○產後血運用韭葉細切盛於有嘴甌中以滾醋泛之急封甌

口以篥嘴納產婦鼻中即甦

或用秤棗及傳石燒紅投醋中重之亦良法也

○又方用鹿角一段燒存性出火毒為末酒調灌下即醒

○血運因氣血俱虛痰火汎上作運二陳導痰隨氣血加減硃

砂安神元亦可服以麥門冬湯下

○一方治血運

人參一兩

紫蘇半兩

石細切童便酒水三物同煎服

○嚴氏清菟散治產後血運昏不知人

澤蘭葉

人參

各一兩

荊芥穗四兩

甘草

炙八錢

川芎二兩

右為細末每服二錢溫酒入童便調下更用

漆器燒烟薰之頻置醋炭更服此藥

○愈風湯治產後中風口噤牙關緊急手足痲痺角弓反張

荊芥穗

當歸各等分焙乾

右爲細末每服三錢荳淋酒調下童便亦可○荳淋酒用大黑豆不拘多少炒焦投好酒中

○新產後不可用芍藥以其酸寒能伐後天之氣也

○產後乳汁不通用通草七分瞿麥紫胡天花粉各一錢桔梗二錢青皮白芷木通赤芍藥連翹甘草各半錢作一貼水煎食後細細飲之更摩乳房或無子食乳者要消乳用麥蘖二兩炒分作四服白湯調下

○產後泄瀉利用陳皮白朮茯苓川芎酒炒芍藥黃芩滑石炙甘草煎服立効○一方無甘草有乾姜按二物皆不可缺

○凡乳母但覺小水短少即是病生便須服藥調治蓋兒飲母乳母安兒安防患未形治法之善者也

婦科

婦科

婦科

卷八

方

卷八

○有產婦因收生者不謹損破尿管而致淋瀝不禁因思肌肉破尚可完補診其脉虛甚蓋難產因氣血虛故產後猶虛試與峻補以參朮為君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐以豬羊脾煎湯熬藥汁極飢飲之一月而安蓋氣血驟長其時即完恐稍遲亦難成功也

○黑神散治產後惡露不盡或胎衣不下血氣攻冲心腹疼痛及血迷血運等証

黑豆

炒半升

熟地黄

當歸

酒浸洗

肉桂

去麋皮

乾姜

炮

甘草

炙

白芍藥

蒲黃

各四兩

濟生方無蒲黃有附子

右為細末每服二錢童便和酒調服

○人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱令

人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄

人參

當歸身

肉桂

麥門冬

白芍藥

炒各一錢

右細切作一服入淡竹葉五片生姜三片水煎服

○當歸黃芪湯治產後失血過多腰痛身熱自汗

當歸身

三錢黃芪

二錢

白芍藥

一錢半炒

右細切作一服水一盞半加生姜三片煎至一盞溫服

○失笑散治產後心腹疼痛欲死及兒枕痛

蒲黃

炒

五靈脂

各等分

右為細末每服二錢熬成膏白湯化下

○三聖散治兒枕痛

當歸

肉桂

玄胡索 各等分

產

右為細末每服二錢熱酒或童便調下

○抵聖湯治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

陳皮

人參

各二錢

甘草

炙一錢

右細切作一服入生姜三片水煎服之

方

○當歸羊肉湯治產後發熱自汗肢體疼痛日久不愈名曰褥

當歸身

人參

各七錢

黃芪一兩

生姜

半兩

右細切用羯羊肉一斤煮取清汁五大盞去肉粗入煎藥

慢火煮取四盞分六服徐徐飲之

產

○扶苓散治產後心虛怔忡不定言語錯亂

人參

甘草

山藥

當歸

各一錢

遠志

扶苓

桂心

麥門冬

各半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一

盞去粗溫服

寶產

○當歸散治產後氣血俱虛恐增客熱宜服此以去惡露

當歸

白芍藥

川芎

黃芩

各一兩

白朮

半兩

右為細末每服二錢童便入溫酒調下

寶產

○黃芪湯治產後虛汗不止

黃芪二錢

白朮

防風

熟地黃

牡蛎粉煨

白茯苓

麥門冬

炙甘草

各半錢

右細切作一服加大棗一枚水煎服

方良

○增損四物湯治產後陰虛發熱或日間明了暮發寒熱

當歸

川芎

生地黃

柴胡

各半分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

○四物一黃散治產服腹中血塊作痛後

當歸

炒

川芎

炒

熟地黄

白芍藥

炒各半兩

蒲黃

炒二錢半

右為細末每服二錢空心溫酒調下

○產寶黑龍丹治產後一切血疼垂死者但灌藥得下無有不

安者

五靈脂

生地黄

當歸

川芎

高良姜

各二錢

錫

右細切用砂窩一箇盛藥外以赤石脂為細末醋調封縫

又以紙筋益泥固濟文武火煨過置地上出火毒研細入

後藥

硫黃

一錢半

花蕊石

另煨

乳香

另研一錢半

琥珀

另研一錢



右同前藥共為極細末醋糊為丸如彈子大每服一九用  
生薑自然汗無灰酒各一合童便平盞合和將藥於炭火  
上燒紅投入姜酒內研散頓服立效

○烏金散治產後血迷血運敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭  
目昏眩多汗無力及治崩中下血不止

麒麟竭洗淨 亂髮洗淨 松墨煅醋淬 百草霜

當歸去芦 肉桂各壹皮 赤芍藥 延胡索

鯉魚鱗燒存性

右各等分為細末每服二錢溫酒調下

○調經散治產後虛浮蓋敗血乘虛停積府藏流注肌肉腐壞  
成水令人面目四肢浮腫切不可用導水泄利之藥是謂  
重虛其虛多致夫亡此藥主之

浸藥

一錢另研

琥珀

一錢另研

桂心

赤芍藥

當歸

各一兩

細辛

射香

半錢另研

右爲細末每服一錢匕姜汁溫酒童便和調服之

○正脾散治產後通身浮腫及治婦人大病後脾氣虛弱中滿

腹脹等病

蓬莪木

炮

香附米

童便

茴香

甘草

炙

陳皮

右各等分爲細末每服二錢灯草木通湯下

良

○栢子仁散治產後譫言妄語皆心血虧欠心神不守所致

栢子仁

遠志

去心

人參

去芦

赤寄生

防風

去芦

琥珀

另細研

當歸

熟地黃

甘草

炙

查

右各等分細切每服五錢先用白羊心一枚而子煮汁二

方局

方局

盡前藥至一盡去羊心及相溫服不拘時

○琥珀散治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

琥珀

鉄粉

各一兩

人參

扶神

生地黄

阿膠珠

各七錢

硃砂

五錢

甘草

射香

各一錢另研

右爲細末和勻每服一錢用金銀煎湯調下

○交感地黄煎丸治產後舌強不語眼見黑花或發狂見鬼及

胞衣不下心腹脹滿等証

生地黄

新經

生薑

各二斤

各用石臼

碎

以布

包

乾

當歸

去芦

延胡索

炒

兩

蒲黃

炒

香

琥珀

另研

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸煎當歸湯化下

食前服

方局

○七珍散治產後不語

人參

石菖蒲

川芎

熟地黃各一兩

細辛一錢

防風五錢去芦

右爲細末每服一錢匕薄許湯調下不拘時服

方局

○調中湯治產後瀉利臍腹痛六脉沉細

高良姜

當歸

桂心

白芍藥

附子

炮去

川芎

各一錢

甘草

炙半錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

方局

○定痛散治產後惡血不尺腹中作痛

當歸

芍藥

各二錢

肉桂

一錢

右細切作一服酒水合一盞半生姜五片煎至一盞服

方局

○麻仁丸治產後大便秘結

麻仁 去壳

枳殼

人參

大黃

當歸 各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸白湯下未通漸加丸數以便潤為度

方局

○羊肉湯治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及寒月中生

此方乃張仲景之方曾試極效

精粥羊肉 四兩 當歸 二兩 生姜 一兩 陳皮 二兩

右細切水三碗酒一盞煎至一碗去粗分二服加葱鹽酥

方局

○滋腸五仁丸治產後血氣虛損大腸閉澀傳道艱難

杏仁 去皮尖

桃仁 如上一兩

柏子仁 半兩

松子仁 二錢

郁李仁 一錢

橘紅 四兩別研為末

右五仁另研爲膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸加至五六十丸食前清米飲下一方加當歸梢五錢

○固經丸治產後血氣未復而有房事及勞後損傷致血暴崩或淋瀝不止

沒藥

赤石脂

補骨脂

木賊各半兩

附子

一隻炮去皮臍

右爲細末米糊爲丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下或陳米飲下

○熟乾地黄散治証同前亦治婦人一切崩中下血不止頭目沉重

熟地黄

半錢 甘草一分

蒲黃

炒黑色半錢

蟹爪

湯炒一錢

白茯苓

半錢

桂心

二分半

阿膠

一錢

炒得鹿角膠子後

白芍藥

半錢

伏龍肝

半錢

昆布

一錢

煨存性

當歸

一錢

右細切作一服入竹茹一錢用水二盞煎至一盞溫服

獨

○拒勝湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定蓋敗血入於脾卑而脾

不能運化故胃不能納穀以致嘔吐腹脹等証

赤芍藥

半錢

澤蘭葉

人參

夫

陳皮

去白各一錢

甘草

炙一分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

獨

○八味理中丸治新產血氣俱傷藏府暴虛體弱多汗一百日

內常服壯氣補虛止嘔吐

人參

去芦

甘草

炙半

乾姜

炮

白朮

二兩

砂仁

一兩

白茯苓

一兩

麥蘖

炒

神麴

炒各一兩

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前姜湯

下有痰者宜加半夏麴

產室

○旋覆花湯治產後感冒風寒咳嗽喘急痰涎壅塞坐卧不能

前胡

麻黃去節

杏仁炒破尖

五味子

茯苓

甘草炙

旋覆花

半夏麴

荆芥穗

赤芍藥各半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一

盞去粗溫服

產室

○四神散治產後留血不消積聚作塊急切疼痛下利不止

當歸去芦

乾姜

川芎

赤芍藥

各半分

右為細末每服三錢溫酒調下

產室

○當歸養血丸治產後惡血不散發熱腹痛及惡露不尽臍腹



堅脹寒治婦人室女經候不調赤白帶下腹脇疼痛

當歸

去芦

赤芍藥

各四兩

牡丹皮

桂心

炒

延胡索

炒各二兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸或酒或米湯  
任下

○指腎子飲治產後尋勞寒熱如瘧咳嗽頭疼自汗體瘦腹中  
疝痛

猪腰子

一對切作四片

當歸

白芍藥

各一兩

右以當歸芍藥二味細切用水三碗煮至二碗去粗將腰  
子切碎如骰子狀入煎藥汁內用晚粳米一合香豉一兩  
葱白五七根同煮藥爛空腹食之日進一服

○當歸黃芪飲治產後陰脫○謂陰戶中宮脫下也

中宮一室中

當歸

白芍藥

黃芪

人參各二錢

升麻半錢

右細切作一服水煎溫服未收再腹

罐

○當歸散治婦人陰脫又名疝願

當歸

黃芩

白芍藥

各一兩蛭皮半兩燒存性

牡蛎煨二兩

右為細末溫酒或米湯調下忌登高舉重

罐

○桃仁膏治產後陰疼煩悶

桃仁

五味子

枯礬

為末研桃仁膏拌付

罐

○硫黃湯治產後王門不斂

硫黃

四兩

吳茱萸

兔絲子

各半

蛇床子一兩

右細切每服四錢水一碗煎湯頻洗之自斂

罐

○婦人乳汁不通有二種有血氣壅盛乳脉滯而不行者有血

氣虛弱乳汁絕少者夫虛者補之用鍾乳粉猪蹄鯽魚之

類盛者行之用通草漏芦土瓜根之類方見于後

鍾

○漏芦湯治婦人肥盛氣脉壅滯乳汁不通或留結爲壅腫痛

將欲成膿者

漏芦

二石半

蛇退

炙一條

土瓜根

十根切片炒焦

按王瓜當作王瓜禮記月令四月王瓜生即此物也其實如瓜萎而小如荔枝色黃藤蔓葉圓無缺者是

右爲末每服貳錢酒調下仍吃熱藥湯助之

產

○鍾乳散治婦人氣虛血少脉澁不行乳汁絕少

鍾乳粉

細研

每服二錢濃煎漏芦湯調下

方

○母猪蹄湯治乳汁不通

母猪蹄一隻

通草

四兩

用水一斗煮取四五升取汁飲之

未下更作一料服之

○丹溪活套云

新產不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣肝主之只以黃芪四物湯爲補虛之要藥以黃芪易芍藥是也○如氣虛者本方加參朮扶苓甘草發熱者加乾姜○自汗多者少用川芎勿用茯苓倍蜜炙黃芪○如口渴加五味子麥門冬○如腹痛者非芍藥不可雖新產亦用但以酒炒不妨○如惡露不天作痛四物湯煎調香附五靈脂末服甚者加桃仁泥四五分○新產子宮未斂作痛名兒枕痛又名癥母塊痛用醋炒芍藥粟殼甘草水煎入少米醋或以三物爲末醋湯調服酸以收之之義也○產後有惡血不去發寒熱成癥瘕者四物湯加三棱蓬朮乳香沒藥香附五靈脂乾漆飛仁紅藍花之類○產後腹痛不息宜四物湯加烏藥香附桂心高良姜陳皮童便和醋煎服甚效○產後月餘經血淋瀝不止四物

斜

加白芷升麻調血餘灰○產後陰痛四物加藁本防風○產  
後通身浮腫四物加乳香沒藥桂心木通大腹皮高良姜血  
竭煨榔海金沙○產後子腸不收八物湯加升麻防風須以  
酒炒黃芪為君○產後中風口眼歪斜八物加附子荆芥少  
加防風羌活煎服